

**MM**

**מחקרים קליניים פתוחים לגיוס**

**JAN 2026**

**יעל נמירובסקי**

# TE NDMM

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר
הדסה שיבא סורוקה רמב"ם רבין	Ententamig (BCMA x CD3)	TE NDMM (not sCR) After ASCT – maintenance	<b>Sub study 2</b> <b>20/40/60 mg</b> <b>Ententamig</b> <b>monotherapy</b>	<b>M25-059</b> <b>Phase I</b>
		TE NDMM (not sCR) After ASCT –	<b>Sub study 4</b> <b>20/40/60 mg</b> <b>Ententamig + Len</b>	
ש"צ הדסה רמב"ם שיבא אסותא בלינסון	IMiD – <b>attaches better</b> <b>to cereblon</b>	TE NDMM After ASCT	<b>Maintenance</b> <b>Iberdomide vs. Len</b>	<b>BMS IM048-</b> <b>022</b> <b>Phase 3</b>
הדסה איכילוב שיבא בלינסון רמב"ם	Tec– (BCMA X CD3)	TE NDMM After ASCT	<b>Maintenance</b> <b>1. Tec + Len</b> <b>2. Len</b> <b>3. Tec</b>	<b>64007957M</b> <b>MY3003</b> <b>Ph3</b>

# TI NDMM

PI	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר
הדסה בלינסון סורוקה הדסה איכילוב	ADC (BCMA)	TI NDMM	Bela rd vs Drd	<b>DREAMM 10 Phase 3</b>
הדסה בלינסון שיבא איכילוב	BCMA X CD3	TI NDMM	<b>Part 2: Elra Dr vs Drd</b>	<b>C1071006 Phase 3</b>
הדסה שיבא סורוקה רמב"ם רבין	Tec (BCMA x CD3) Tal (GPRC5D x CD3)	TI NDMM	<b>Arm A: Tec Dr Arm B: Tal Dr Arm C: Drd</b>	<b>64007957MMY3005</b>
הדסה שיבא סורוקה רמב"ם רבין	Ententamig (BCMA x CD3)	TI NDMM	<b>Sub study1 20/40/60 mg Ententamig + Drd</b>	<b>M25-059 Phase I</b>

# RRMM- early relapse- CART

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה	אופציה ל- CART בשלב מוקדם	2 LOT (PI+IMiD+anti cd38) or Progression less than 18m after 1 <sup>st</sup> line with PI+IMiD+anti cd38	<b>Anti-BCMA CART HBI0101</b>	<b>HBI0101 phase 2</b>	FHR or after 2  AMY: After 1 (PI and anti CD38) or insufficient response after PI and anti CD38)
הדסה איכילוב שיבא	CART GPRC5D	LEN exposed	1:1 <b>Arm A: Bridging (DPd or Kd) + arlo-cel</b> <b>Arm B: SOC regimen: DPd or Kd</b>	<b>CA088-1007 Ph3</b>	After 1-3

# RRMM- early relapse- bispecifics

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
שיבא איכילוב רמב"ם הדסה	שני ביספציפיים בשילוב	3 LOT (PI or IMiD or anti cd38) or Progression on or after anti-cd38 with double refractory to IMiD and PI, or intolerance of therapy	2:1 Cevo + elra: elra	GO43979 Phase I	After 3 or triple refractory/in tolerance to therapy
הדסה בלינסון	BCMA X CD3	Anti-CD38, Len exposure in any prior line PR or better on any prior line BCMA: no CD3: no	Elra vs SOC (EPd or PVd or Kd)	C1071032 Phase 3	After 1-4
הדסה רמב"ם סורוקה בלינסון שיבא	BCMA X CD3	PI or IMiD or Anti cd38 BCMA: No CD3 TCE LL: No	Sub 3: Ententemig + Kd	M25-059 Phase I	After 1-3

# RRMM- early relapse

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה שיבא	Anti Cd38	Naïve anti cd38 or 12 months after anti CD38 (2 cycles)	Isa+pom+dex	ACT16482 SU 1 Ph 1	After 2
	IL-2	- Anti Cd38 exposure (2 cycles) - Anti BCMA (if in Basket)	Isa + Pegenzileukin (IL-2) <b>כרגע סגור</b>	ACT16482 SU 4 Ph 1	After 2
	For GVHD	Anti Cd38 exposure (2 cycles) Anti BCMA (if in Basket)	Isa + belu + dex	ACT16482 SU5 Ph 1	After 2
	Anti CD47	Naïve anti cd38 or 12 months after anti CD38 (2 cycles)	Isa+ evorpacept (anti cd47) + Dex	ACT16482 SU 6 Ph 1	After 2

# RRMM- early relapse

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה שיבא רמב"ם איכילוב בלינסון מאיר	IMiD better attached to cereblon	Len exposed and > MR at least one prior LOT	Mezi Vd vs PomVd	CA057-001 Phase 3	After 1-3

# RRMM- later relapse- CART studies

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה	אופציה ל- CART שיכול להיות יעיל יותר	3 LOT (PI+IMID+anti cd38)  First cohort- only EMD / prior anti-BCMA therapy	<b>Anti-BCMA naive CART HBI0101</b>	<b>Naïve HBI0101 phase 1</b>	After 3
הדסה	אופציה ל- CART בשלב מוקדם	2 LOT (PI+IMID+anti cd38) or Progression less than 18m after 1 <sup>st</sup> line with PI+IMID+anti cd38	<b>Anti-BCMA CART HBI0101</b>	<b>HBI0101 phase 2</b>	FHR or after 2
הדסה איכילוב שיבא	CART GPRC5D	LEN exposed	<b>1:1 Arm A: Bridging (DPd or Kd) + arlo-cel Arm B: SOC regimen: DPd or Kd</b>	<b>CA088-1007 Ph3</b>	After 1-3

# RRMM- later relapse- bispecifics

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה שיבא איכילוב רמב"ם	FCRH5/BCMA X CD3	3 LOT (PI or IMiD or anti cd38) or Progression on or after anti-cd38 with double ref. to IMiD and PI, or intolerance of therapy	2:1 Cevo + elra: elra	GO43979 Phase I	After 3 or triple refractory/intolerance to therapy
הדסה בלינסון	BCMA X CD3	Anti-CD38, Len exposure in any prior line PR or better on any prior line BCMA: no CD3: no	Elra vs EPd or PVd or Kd	C1071032 Phase 3	After 1-4
הדסה סורוקה רמב"ם שיבא בלינסון	BCMA X CD3	PI or IMiD or Anti cd38 BCMA: No CD3 TCE LL: No	Sub 3: Ententemig + Kd	M25-059 Phase I	After 1-3

# RRMM- later relapse- bi and tri specifics

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה אסותא אשדוד	GPRC5D/ BCMA X CD3	3 LOT and triple class exposed (PI and IMiD and anti CD38)	<b>Tri (GPRC5D, BCMA, CD3) monotherapy</b>	<b>7965322MMY2001 Ph 2</b>	After 3
רמב"ם	GPRC5D/ BCMA X CD3	3 LOT and triple class exposed (PI and IMiD and anti CD38)	<b>1:1 Tri (GPRC5D, BCMA, CD3) vs. Tec</b>	<b>79635322MMY3001 Ph3</b>	After 3

# RRMM- later relapse- bispecifics

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה רמב"ם איכילוב	GPRC5D NK cells	Triple class refractory (IMiD, PI, anti cd38).  Part A: BCMA and GPRC5D - <b>Yes</b>	<b>SAR446523 - anti GPRC5D ADCC enhanced antibody (NK cells)</b>	<b>TED18162 Phase I</b>	After 3 lines
הדסה שיבא בלינסון רמב"ם	BCMA X CD3	Triple refractory (IMiD, PI, anti CD38). CART and BCMA - <b>No</b>	<b>Elra SC + TTI-622 (anti cd47) IV</b>	<b>C1071020 PART 2A Phase 1 אין סלטים</b>	After 3 lines
הדסה שיבא בלינסון	BCMA X CD3	Triple class exposed (IMiD, PI, anti cd38) CART BCMA - Yes BCMA - <b>No</b>	<b>Outpatient: Ententamig monotherapy IV</b>	<b>M24-108 Phase 1 נסגר</b>	After 2 lines
הדסה איכילוב שיבא	BCMA X CD3	Triple class exposed (IMiD, PI, anti CD38)	<b>Ententamig SC</b>	<b>M23-001 Phase 1 נסגר</b>	After 3-5

# RRMM- later relapse- bispecifics

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה רמב"ם	BCMA X CD3	3 LOT or 2 LOT (triple refractory or double refractory PI and IMiD)	Linvo + pom	R4548-ONC-2012 SU 05	After 3
	BCMA X CD3		Linvo + Isa	R4548-ONC-2012 SU 06	After 3
	BCMA X CD3	3 LOT (PI, IMiD, anti cd38) or triple class refractory (PI, IMiD, anti CD38). BCMA Prior : Yes	Linvo + Cempilimab (anti PD-1)	R4548-ONC-2012 SU 08	After 3
	BCMA X CD3	3 LOT and triple refractory (PI, IMiD, anti CD38).	linvo+ Nirogacestat (anti gamma secretase) (PO)	R4548-ONC-2012 SU 09	After 3
	BCMA X CD3	3 LOT (PI, IMiD, anti cd38) or triple class refractory (PI, IMiD, anti CD38) Prior BCMA: Yes	linvoseltamab (regn5458) + SLAG3 (check point inhibitor)	R4548-ONC-2012 SU 07	After 3

# RRMM- later relapse- other compounds

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה איכילוב שיבא בלינסון רמב"ם	Anti BCL2	- t(1 1;14) and/or BCL2 <sup>high</sup> status. -No Dara refractory to last treatment No anti-cd38 within 6 months. Triple class exposed (PI, IMiD and anti CD38).	ABBV -453 (anti BCL2) +Dd	M25-275 Phase I	After 3-5
הדסה שיבא רמב"ם איכילוב בלינסון מאיר	IMiD better attached to cereblon	Len exposed and > MR at least one prior LOT	Mezi Vd vs PomVd	CA057-001 Phase 3	After 1-3
הדסה רמב"ם שיבא אסותא אשדוד בני ציון העמק ש"צ מאיר בלינסון	Selinexor	Pentarefractory 2 PIs 2 IMiD Anti cd38	Sd	Xport MM-028 (Ph 2b)	After 4

# SMM

מרכזים	יחוד	אוכלוסיית החולים	טיפול המחקר	שם המחקר	קווי טיפול
הדסה מכבי בלינסון רמב"ם שיבא	טיפול גוף נפש	SMM שאובחנו בחמש השנים האחרונות בוצעה להם בדיקת מח עצם ללא מחלה ממארת פעילה אחרת ללא מחלת נפש משמעותית כגון ביפולריות, סכיזופרניה, הפרעת אישיות גבולית	קבוצת ביקורת + קבוצת טיפולית ביקורת: מעקב רגיל (מעקב מעבדתי כל 2-3 חודשים) טיפול: מפגשים פרטניים עם מטפלות. המפגשים מתנהלים כשיחה + מדיטציה (25 פגישות בשנה באופן מקוון או פרונטלי) + מעקב מעבדתי כל 2-3 חודשים. מפגשים קבוצתיים – בזום. אחת לחודש.	השפעת טיפולי גוף נפש על מהלך מיאלומה זוחלת (SMM)	ללא