

מבחן שלב ב' ברפואת עיניים

בהצלחה

שאלה גדולה

- בת 63 מדווחת כי בשנים האחרונות סובלת מעיניים אדומות, מגורות מאד ודומעות, למרות טיפות ומשחות מסוגים שונים.

- בשנה האחרונה מתועדים בתיקה הרפואי מספר רב של ביקורים אצל רופא העיניים בהם מתועדת דלקת לחמית וגם ארוזיה גדולה בעין שמאל שלא מתרפאת


- בבדיקה – חדות ראייה מימין 6/6, משמאל 6/60 לת"ע 12 דו"צ

- בשקף הבא – תמונות של שתי עיניה


לפניך צילומים של שתי עיניה - תאר/י את התמונה - מהן הסיבות האפשריות
למצב בתמונה?

• מה תשאל/י באנמנזה?

• כיצד מתקדמים באבחנה?



OD





OS

לפניך שתי תמונות מאותה הבדיקה.

• תאר/י את הבדיקה.

• כיצד תתקדם/י בשלב זה?

• מהן החסרונות של בדיקה זו בהקשר למחלה שאותה היא נועדה לאבחן?




הוחל טיפול באבחנה משוערת של mucous membrane pemphigoid.

- מהי הפרוגנוזה הצפויה במחלה זו?
- מהם הסיבוכים האפשריים של מחלה זו?
- מהם קווי הטיפול המקובלים במחלה זו?

המטופלת קיבלה במשך חצי שנה חצי גרם ציקלופוספמיד פעם בחודש,
בתוספת פרדניזון 20מ"ג, הדלקת נרגעה והושארה רק על פרדניזון 10מ"ג.

כעבור 3 חודשים נוספים מגיעה למיון עם גירוי חדש, ירידה בראייה בעינה
היחידה ל 6/20 והתמונה הבאה:

• מהן אפשרויות הטיפול במטופלת?



המטופלת מקבלת Rituximab מזה חצי שנה,
שקטה לחלוטין מבחינת הדלקת, אך כעת חדות
הראיה בעין ימין ירדה ל6/120
בבדיקתה נמצא לחץ תקין, ירוד PSC++++,
קרקעית בטשטוש תקינה.

• כיצד מתקדמים?


לאחר ניתוח הקטרקט, מחלתה של המטופלת התלקחה והקרנית הצטלקה לחלוטין.
חדות הראיה כעת HM מימין ומשמאל, מבחינה בצבעים, אולם אינה רואה מספיק אפילו
כדי להסתובב עצמאית בביתה.

לחץ דיגיטלי תקין וUSI גלגל העין תקין

המטופלת מעוניינת לחזור לראות.

• להלן תמונה של עינה הימנית, מצב דומה בשמאלית.

• מה ניתן להציע למטופלת בשלב זה?




שאלה קטנה

בת 48, מעוניינת בהסרת משקפיים בלייזר.

החלה להרכיב משקפיים מגיל 7. המספר עלה בהדרגה מגיל 7 עד שנעצר בסביבות גיל 17, ויציב מאז ועד עתה.

- מה לדעתך ההפרעה הרפרקטיבית הסבירה, מיופיה או היפראופיה?
- מה תצפה/י שתהיה הרפרקציה הציקלופלגית של המטופלת לעומת הרפרקציה הסובייקטיבית שלה?
- מה תשאל/י את המטופלת לצורך אישור ניתוח הסרת המשקפיים?
- אילו בדיקות תבצע/י למטופלת לפני הניתוח?



הרפרקציה הסובייקטיבית והציקלופלגית של המטופלת היא 4.5- ללא אסטיגמציה בשתי העיניים.

היא מתארת שהיא רואה מצוין לטווח קרוב ללא משקפיים, אך מתקשה לקרוא עם משקפיה המונופוקליים בשנים האחרונות.

בדיקת עיניים:

בשתי העיניים BCVA 6/6, לת"ע 12 דו"צ. בדיקת עיניים מליאה תקינה דו"צ

• תאר את המיפוי

• מהן האופציות העומדות בפניה, ומהם החסרונות והיתרונות של כל

אופציה?

• איזו שיטת ניתוח ניתן להציע לה?




• כיצד ניתן להעריך איזו אופציה היא הנכונה ביותר למטופלת זו?

• המטופלת אינה רוצה

משקפיים כלל, לא

לקרוב ולא לרחוק.

תארי את סוגי הניתוחים השונים להסרת משקפיים שלפניך:



• מהם היתרונות ומה החסרונות של ניתוחים אלה?

המטופלת עברה ניתוח לאסיק עם רפרקציית מטרה: אמטרופיה בעין הדומיננטית,
ובעין הלא-דומיננטית 1.5-

היא חוזרת לבדיקה לאחר 9 חודשים ומדווחת שהיא אינה מסתגלת לפער בין
העיניים ומבקשת תיקון.

- אילו אפשרויות ניתוחיות קיימות כעת? מה ההשלכות שלהן?
- מה צריך להדגיש בפני המטופלת לגבי ראייתה לאחר הניתוח?

סיום הבחינה