

מבחן שלב ב' ברפואת עיניים

בהצלחה

שאלה גדולה

בת 27, בריאה בד"כ, ללא רקע עיני



פנתה למיון בשל כתם אפרפר סמוך למרכז הראייה בשתי העיניים מזה יומיים

בבדיקתה:

- חדות ראייה 6/6 בכל עין

- לחץ תוך עיני 12/12 ממ"כ

• מה תבדוק/י?




- תארי את הממצאים בתמונות
- מה תשאל/י באנמנזה?
- כיצד תמשיך/י בבירור?



• תאר/י:

• כיצד הממצאים בצילום מקדמים לכיוון אבחנה?



• איך תתקדם/י?



• תאר/י:

• איזה מידע ההדמיות

הנ"ל הוסיפו לך?



להלן גם צילום OCTA של המטופלת.

• תארי

• מה האבחנה המבדלת?

• איזה בירור היית מבצע/ת בשלב זה?

ללחוץ על העכבר





בירור סיטסמי שלילי

• מה האבחנה הכי סבירה במקרה זה?

• האם יש בדיקה נוספת שחשובה במקרה זה?


• כיצד תטפלי?

• האם נדרש טיפול ממושך?




המטופלת טופלה בפרדניזון פומי במינון 60 מ"ג עם שיפור בממצאים הקליניים
ובתלונותיה, ובוצעה ירידה הדרגתית במינון לאורך 4 חודשים.

כאשר המטופלת הגיעה למינון פרדניזון של 10 מ"ג היא החלה שוב להתלונן
על כתם אפור בשדה הראיה של עין שמאל.



• לפניך הדמיה של עין שמאל, **תארי**

• **כיצד תטפלי?**



חצי שנה לאחר התחלת טיפול באימורן:

- תארי -

- מה המלצתך להמשך?

שאלה קטנה

בן 40, פנה עקב אודם וכאב עז בעין שמאל מזה מספר ימים

• תאר/י:

• מה תשאל/י לגבי
הממצא העיני?

• מהי האבחנה המבדלת
העינית?



• בבדיקתו:

חדות ראייה: עין ימין 6/6, עין שמאל 6/7.5
לת"ע: 12/12 ממ"כ

תגובת אישונים תקינה, ללא RAPD

בשתי העיניים

מקטע קדמי: קרנית שקופה, ל"ק עמוקה ושקטה, עדשה זכה
מקטע אחורי: זגוגית צלולה, דיסקה תקינה, מקולה שמורה, כלי דם
תקינים, רשתית צמודה

• מה תשאל/י?

• איזו בדיקה קלינית תעזור בקביעת האבחנה?



- לאחר בדיקת אפרין 10%, תאר/י:

- מה האבחנה הכי סבירה?

- מהם הסוגים המוכרים?

- מה הסימנים הקליניים?

- האם נדרשת בדיקת הדמייה?

- מה הברור הסיסטמי הנדרש?

- מה הסיכוי לאבחן מחלה סיסטמית?

- כיצד תטפל/י?



המטופל קיבל איבופן פומי 400 מ"ג 3X פעמים ביום,

לאחר יומיים שיפור ניכר בכאבים

• תאר/י:

• מה ההמלצה להמשך?

ללחוץ על העכבר

פנה למיון לאחר שבוע עם חזרה של אודם, כאבים ורגישות ניכרת

למגע בעין שמאל.

• מהן הסיבות האפשריות?

ללחוץ על העכבר

באנמנזה הסתבר שהמטופל הרגיש טוב ולכן הפסיק ליטול את האיבופן

• כיצד תטפל/י כעת?

• מהו הטיפול אם מופיעה עוד חזרה תוך חודשיים של הממצאים?

סיום הבחינה